

Stochastik für Informatik, (6LP)
Klausur

30. September 2019

Name _____ Matrikelnummer _____

Vorname _____ Studiengang _____

Informationen

Füllen Sie bitte zuerst das Deckblatt vollständig und leserlich aus. Vergewissern Sie sich, dass das Aufgabenblatt vollständig ist. Damit erklären Sie, dass

- Ihnen die für diese Prüfung relevanten Zulassungsvoraussetzungen aus der StuPO bekannt sind. Ihnen ist außerdem bewusst, dass ihre Nichterfüllung zur Ungültigkeit der Prüfung führen kann. (§39 Abs. 2 Satz 4 AllgStuPO)
- Ihnen bekannt ist, dass die Teilnahme an der Prüfung eine ordnungsgemäße Anmeldung voraussetzt, andernfalls die Prüfung nicht gültig ist. (§39 Abs. 2 AllgStuPO)
- Ihnen bekannt ist, dass eine Prüfung, die unter bekannten und bewusst in Kauf genommenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen abgelegt wird, grundsätzlich Gültigkeit hat.

Schreiben Sie auf *jedes* von Ihnen benutzte Papier *sofort* Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.

Bei der Klausur sind 50 Punkte erreichbar. Ab 25 Punkten ist die Klausur bestanden. Als Hilfsmittel darf, wie angekündigt, ein beidseitig handbeschriebenes DIN-A4-Blatt sowie ein nicht programmierbarer Taschenrechner benutzt werden. Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

Geben Sie immer den *vollständigen* Rechenweg an und *begründen* Sie Ihre Lösungsschritte. Ihre Lösung muss auch ohne Taschenrechner nachvollzogen werden können. Der Taschenrechner dient lediglich der Ausführung von elementaren Rechenoperationen.

Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.

1	2	3	4	5	Σ

Aufgabe 1

10 Punkte

Ein Signal wird über einen von drei Kanälen A, B, C gesendet. Kanal A wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% ausgewählt, B und C jeweils mit 30%. Bei Kanal A kommt es mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% zu einem Übertragungsfehler, bei B mit 20% und bei C mit 15%. Für mehrere Signale sind sowohl die Auswahl des Kanals als auch das Auftreten von Übertragungsfehlern unabhängig voneinander.

- Stellen Sie die Situation als Baum dar. Schreiben Sie die im Aufgabentext gegebenen Wahrscheinlichkeiten an die richtigen Stellen im Baum.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt ein gesendetes Signal korrekt an?
- Wenn ein Signal korrekt ankommt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde es über Kanal B geschickt?


Es werden nun zwei verschiedene Signale gesendet. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Ereignisse:

- Mindestens ein Signal wird fehlerhaft übertragen.
- Beide Signale werden über denselben Kanal übertragen.

Aufgabe 2

10 Punkte

Sei $(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Markov-Kette auf $S = \{1, 2, 3, 4\}$ mit Übergangsgraph



- Ist die Markov-Kette irreduzibel? Ist sie aperiodisch? (Begründen Sie).
- Bestimmen Sie alle möglicherweise vorhandenen invarianten Verteilungen.

Sei nun die Startverteilung $\nu = (1, 0, 0, 0)$, d.h. $X_0 = 1$.

- Geben Sie die Verteilung von X_1 und X_2 an.
- Geben Sie $\mathbb{P}(X_n = 1)$ und $\mathbb{P}(X_n = 4)$ jeweils allgemein für gerade und ungerade $n \in \mathbb{N}$ an. Was können Sie über $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = 1)$ aussagen?

Aufgabe 3

10 Punkte

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} ae^{-x}, & x \in [0, 2] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass es sich bei f um eine Dichte einer Zufallsvariablen X handelt.
- Berechnen Sie die Verteilungsfunktion von X .
- Berechnen Sie $\mathbb{P}(1 \leq X^2 \leq 4)$.
- Berechnen Sie $\mathbb{E}[e^X]$.

Hinweis: Falls Sie Aufgabe (a) nicht lösen konnten, können Sie in die weiteren Aufgabenteile in Abhängigkeit von a lösen.

Aufgabe 4

10 Punkte

Die gemeinsame Verteilung von zwei Zufallsvariablen X, Y mit Werten in $\{1, 2, 3, 4\}$ sowie die Randverteilung von Y sind in der folgenden Tabelle gegeben.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0.24	0.12	0.04	0
2	0.24	0.12	0	0.04
3	0.06	0.03	0.005	0.005
4	0.06	0.03	0.005	0.005
p_Y	0.6	0.3	0.05	0.05

- Berechnen Sie die Erwartungswerte von Y und Y^2 .
- Sind X und Y unabhängig? Warum?
- Berechnen Sie die Kovarianz von Y und Y^2 .
- Sei $g: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ eine Funktion definiert durch $g(1) = 1$, $g(2) = 2$, $g(3) = g(4) = 3$. Geben Sie die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen $g(X)$ und $g(Y)$ sowie die Randverteilungen von $g(X)$ und $g(Y)$ an.

Aufgabe 5

10 Punkte

In einem Land werden n Flughäfen gebaut. Jeder Flughafen wird mit Wahrscheinlichkeit $1/(2n+2)$ rechtzeitig eröffnet, unabhängig von allen anderen Flughäfen, wobei $n \in \mathbb{N}$.

- Für $n \in \mathbb{N}$, sei X die Anzahl der Flughäfen, die rechtzeitig eröffnet werden. Welche Verteilung hat X ? Berechnen Sie ihren Erwartungswert und ihre Varianz.
- Sei $n = 10$. Berechnen Sie
 - die Wahrscheinlichkeit, dass nicht mehr als zwei Flughäfen rechtzeitig eröffnet werden,
 - die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass kein Flughafen rechtzeitig eröffnet wird, gegeben, dass nicht mehr als zwei Flughäfen rechtzeitig eröffnet werden.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 Flughäfen rechtzeitig eröffnet werden, mit einer geeigneten Approximation für $n = 100$.