

Februar – Klausur
 Lineare Algebra für Ingenieure
 Lösungsskizze Klausurvariante B

1. Aufgabe

11 Punkte

Gegeben sei das folgende reelle lineare Gleichungssystem:

$$\begin{array}{cccccc} -x_1 & + & x_2 & - & x_3 & - & x_4 & = & -2 \\ & & & & x_2 & + & & + & 2x_4 & = & -3 \\ 3x_1 & - & x_2 & + & 3x_3 & + & 7x_4 & = & 0 & . \end{array}$$

- (a) Stellen Sie die zugehörige erweiterte Koeffizientenmatrix $[A|\vec{b}]$ auf und bringen Sie diese in normierte Zeilenstufenform.
 (b) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems.
 (c) Bestimmen Sie $\text{Bild}(A)$ und $\text{Kern}(A)$.
 (d) Ist die zu A zugehörige Matrixabbildung injektiv? Ist sie surjektiv?

(a) (4 Punkte)

$$[A|\vec{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 3 & 7 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\text{-I}]{\text{III}+3\text{I}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -6 \end{array} \right] \xrightarrow[\text{III}-2\text{II}]{\text{I}+\text{II}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] = \text{NZSF}([A|\vec{b}])$$

(b) (3 Punkte)

Ausgehend von der NZSF in a): Die Nichtkopfvariablen parametrisieren die Lösungsmenge. Setze: $x_3 := s, x_4 := t \in \mathbb{R}$. Dann gilt für die Kopfvariablen: $x_1 + s + 3t = -1 \Leftrightarrow x_1 = -1 - s - 3t$ und $x_2 + 2t = -3 \Leftrightarrow x_2 = -3 - 2t$. Somit ist die Lösungsmenge des LGS:

$$\mathcal{L} = \left\{ \left[\begin{array}{c} -1 - s - 3t \\ -3 - 2t \\ s \\ t \end{array} \right] \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \left[\begin{array}{c} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] + s \underbrace{\left[\begin{array}{c} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right]}_{\text{Kern}(A)} + t \left[\begin{array}{c} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right] \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

(c) (2 Punkte)

Eine Basis von $\text{Bild}(A)$ bilden die Spalten der Matrix A , bei denen in der NZSF ein Kopf steht.

Nach a) sind dies die erste und die zweite Spalte von A . Somit ist $\text{Bild}(A) = \text{span} \left\{ \left[\begin{array}{c} -1 \\ 0 \\ 3 \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ -1 \end{array} \right] \right\}$.

Die Lösungsmenge in b) setzt sich aus einer partikulären Lösung des inhomogenen LGS und den Lösungen des zugehörigen homogenen LGS, also $\text{Kern}(A)$ zusammen.

$$\text{Somit ist } \text{Kern}(A) = \left\{ s \left[\begin{array}{c} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right] + t \left[\begin{array}{c} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right] \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \left[\begin{array}{c} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right] \right\}$$

(d) (2 Punkte)

Nach c) ist $\text{Kern}(A) \neq \{\vec{0}\}$. Somit ist die zu A zugehörige Matrixabbildung nicht injektiv.

$\text{Bild}(A) \neq \mathbb{R}^3$, da nach c) $\text{Bild}(A)$ von zwei Vektoren aufgespannt werden kann, der \mathbb{R}^3 jedoch dreidimensional ist. Somit ist die zu A zugehörige Matrixabbildung auch nicht surjektiv.

2. Aufgabe

10 Punkte

Gegeben seien die Matrizen

$$B_1 := \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 7 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_2 := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 7 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_3 := \begin{bmatrix} 2 & -6 & 0 & 7 \\ -2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & -8 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4,4}.$$

- (a) Bestimmen Sie $\det(B_1)$ mithilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes.

- (b) Bilden die Spalten von B_1 eine Basis des \mathbb{R}^4 ?
- (c) Bestimmen Sie $\det(B_2)$.
- (d) Bestimmen Sie $\det(B_3)$.

(a) **(4 Punkte)**

$$\det(B_1) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 7 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Laplace}}{\underset{\text{3. Zeile}}{=}} (-1)^{3+4} \cdot (5) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} \\ \stackrel{\text{Laplace}}{\underset{\text{3. Spalte}}{=}} -5((-1)^{2+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}) \\ = -5[-1 \cdot (2 \cdot 4 - 3 \cdot 1) + (2 \cdot (-2) - 3 \cdot (-2))] = -5(-5 + 2) = 15$$

- (b) **(2 Punkte)** Vier lin. unabh. Vektoren aus dem \mathbb{R}^4 bilden eine Basis des \mathbb{R}^4 , da $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$. Die vier Spaltenvektoren von B_1 sind lin. unabh., da nach a) $\det(B_1) = 15 \neq 0$. Somit bilden sie auch eine Basis des \mathbb{R}^4 .
- (c) **(2 Punkte)** B_2 ist bis auf das Tauschen der ersten und dritten Zeile identisch mit B_1 . Beim Vertauschen zweier Zeilen einer Matrix ändert sich das Vorzeichen der Determinante:
 $\det(B_2) = -\det(B_1) = -15$.
- (d) **(2 Punkte)** Die Spaltenvektoren von B_1 seien $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4$. Dann ist $B_3 = [\vec{b}_1 \ (-2) \cdot \vec{b}_2 \ \vec{b}_3 \ \vec{b}_4]$ und
 $\det(B_3) = \det([\vec{b}_1 \ (-2) \cdot \vec{b}_2 \ \vec{b}_3 \ \vec{b}_4]) = -2 \cdot \det([\vec{b}_1 \ \vec{b}_2 \ \vec{b}_3 \ \vec{b}_4]) = -3 \cdot \det(B_1) = -2 \cdot 15 = -30$.

3. Aufgabe

10 Punkte

Gegeben sei die Matrix $C := \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$.

- (a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte und zugehörigen Eigenräume von C .
- (b) Ist C diagonalisierbar?
- (c) Ist C invertierbar?

(a) **(6 Punkte)**

C ist eine obere Dreiecksmatrix. Die Eigenwerte stehen somit auf der Diagonalen: $\lambda_{1/2} = -2$ und $\lambda_3 = 0$.

Die Eigenräume sind dann:

$$V_{\lambda_{1/2}} = \text{Kern}(C - (-2)I_3) = \text{Kern} \left(\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \stackrel{\text{II} - \text{I}}{\underset{\frac{1}{2}\text{I}}{=}} \text{Kern} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

und

$$V_{\lambda_3} = \text{Kern}(C - 0I_3) = \text{Kern}(C) = \text{Kern} \left(\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \right) \stackrel{\text{III} + 2\text{II}}{\underset{-\frac{1}{2}\text{I}}{=}} \text{Kern} \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

- (b) **(2 Punkte)** $\lambda_{1/2}$ ist ein doppelter Eigenwert, die alg VFH ist somit 2. Die geom VFH von $\lambda_{1/2}$ ist 1, da nach $V_{\lambda_{1/2}}$ von einem lin. unabh. Vektor aufgespannt wird und somit $\dim(V_{\lambda_{1/2}}) = 1$ gilt. C ist nicht diagonalisierbar, da $\text{geom VFH}(\lambda_{1/2}) = 1 \neq 2 = \text{alg VFH}(\lambda_{1/2})$.
- (c) **(2 Punkte)** Nach a) gilt $V_{\lambda_3} = \text{Kern}(C - 0I_3) = \text{Kern}(C) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \neq \{ \vec{0} \}$. Somit ist C nicht invertierbar.

4. Aufgabe

12 Punkte

Gegeben sei mit $\mathcal{B} := \{x, x - 1\}$ eine Basis des $\mathbb{R}_{\leq 1}[x]$, sowie die lineare Abbildung

$$L : \mathbb{R}_{\leq 1}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 1}[x]; \quad ax + b \mapsto (2a + 2b)x + (2a + 2b).$$

- (a) Bestimmen Sie Kern(L).
- (b) Bestimmen Sie die darstellende Matrix $L_{\mathcal{B}}$ von L bzgl. der Basis \mathcal{B} .
- (c) Ein Eigenwert von L ist 0. Geben Sie einen zugehörigen Eigenvektor an.
- (d) Sei $\mathcal{C} = \{p_1, p_2\}$ eine weitere Basis des $\mathbb{R}_{\leq 1}[x]$ und $S_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ die Transformationsmatrix beim Basiswechsel von \mathcal{B} nach \mathcal{C} . Bestimmen Sie \mathcal{C} .

(a) **(4 Punkte)**

$$\text{Kern}(L) = \{ax + b \in \mathbb{R}_{\leq 1}[x] \mid L(ax + b) = 0x + 0\}$$

$$L(ax + b) = (2a + 2b)x + (2a + 2b) = 0x + 0$$

Koeffizientenvergleich führt auf das LGS $2a + 2b = 0, 2a + 2b = 0$. Für die erste bzw. die zweite Gleichung gilt $2a + 2b = 0 \Leftrightarrow 2b = -2a \Leftrightarrow b = -a$.

$$\text{Somit ist Kern}(L) = \{ax - a \mid a \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{x - 1\}.$$

(b) **(4 Punkte)**

spaltenweise Bestimmung von $L_{\mathcal{B}}$:

$$L_{\mathcal{B}}\vec{e}_1 = K_{\mathcal{B}}(L(K_{\mathcal{B}}^{-1}(\vec{e}_1))) = K_{\mathcal{B}}(L(x)) = K_{\mathcal{B}}(2x + 2) = K_{\mathcal{B}}(4 \cdot x - 2(x - 1)) \stackrel{\text{lin.}}{=} 4 \cdot K_{\mathcal{B}}(x) - 3 \cdot$$

$$K_{\mathcal{B}}(x - 1) = 4\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$L_{\mathcal{B}}\vec{e}_2 = K_{\mathcal{B}}(L(K_{\mathcal{B}}^{-1}(\vec{e}_2))) = K_{\mathcal{B}}(L(x - 1)) = K_{\mathcal{B}}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$L_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

(c) **(2 Punkte)**

Nach a) ist $x - 1 \in \text{Kern}(L)$. Somit $x - 1$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 0 von L , da $L(x - 1) = 0 = 0 \cdot (x - 1)$.

(d) **(2 Punkte)** Für die Spalten von S gilt:

$$S\vec{e}_1 = K_{\mathcal{C}}(K_{\mathcal{B}}^{-1}(\vec{e}_1)) = K_{\mathcal{C}}(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ und}$$

$$S\vec{e}_2 = K_{\mathcal{C}}(K_{\mathcal{B}}^{-1}(\vec{e}_2)) = K_{\mathcal{C}}(x - 1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ Daraus folgt das LGS } 1 \cdot p_1 + 1 \cdot p_2 = x, 1 \cdot p_1 + 0 \cdot p_2 = x - 1.$$

Die zweite Gleichung ergibt $p_1 = x - 1$. Setzt man dies in die erste Gleichung ein, erhält man $x - 1 + p_2 = x \Leftrightarrow p_2 = 1$. Somit ist $\mathcal{C} = \{x - 1, 1\}$.

alternativ: Für das i -te Basiselement in \mathcal{C} gilt $p_i = K_{\mathcal{C}}^{-1}(\vec{e}_i) = K_{\mathcal{B}}^{-1}(S^{-1}(\vec{e}_i))$. S^{-1} bestimmen:

$$[S|I_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\text{I}+\text{II} \\ -1 \cdot \text{II}}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right] = [I_2|S^{-1}].$$

$$\text{Dann gilt für } p_1 = K_{\mathcal{B}}^{-1}(S^{-1}(\vec{e}_1)) = K_{\mathcal{B}}^{-1}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 0 \cdot (x) + 1 \cdot (x - 1) = x - 1 \text{ und für}$$

$$p_2 = K_{\mathcal{B}}^{-1}(S^{-1}(\vec{e}_2)) = K_{\mathcal{B}}^{-1}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = 1 \cdot (x) - 1 \cdot (x - 1) = 1.$$

Somit ist $\mathcal{C} = \{x - 1, 1\}$.

5. Aufgabe

8 Punkte

Gegeben sei die Menge $M := \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2} \mid b - d = 0 \right\}$.

- (a) Zeigen Sie, dass M ein Teilraum des $\mathbb{R}^{2,2}$ ist.
- (b) M ist dreidimensional. Geben Sie eine Matrix A an, sodass $\mathcal{B} := \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A \right\}$ eine Basis von M ist und begründen Sie, dass \mathcal{B} mit dem gewählten A eine Basis von M ist.
- (c) Zeigen Sie, dass $N := \{B \in \mathbb{R}^{2,2} \mid B^2 = 0\}$ kein Teilraum von M ist.

(a) **(3 Punkte)**

$$M \neq \emptyset, \text{ da z.B. } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M, \text{ denn } 0 - 0 = 0.$$

$$\text{Für } A_1 := \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, A_2 := \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \in M \text{ ist } b_1 - d_1 = 0 \text{ und } b_2 - d_2 = 0.$$

$$\text{Dann gilt für } A_1 + A_2 = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}:$$

$$(b_1 + b_2) - (d_1 + d_2) = (b_1 - d_1) + (b_2 - d_2) \stackrel{\text{n.V.}}{=} 0 + 0 = 0.$$

Also ist $A_1 + A_2 \in M$ und M abgeschlossen bzgl. Addition.

Für $A := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ist $b - d = 0$.

Dann gilt für $\alpha A = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{bmatrix}$:

$$\alpha b - \alpha d = \alpha(b - d) \stackrel{\text{n.V.}}{=} \alpha \cdot 0 = 0.$$

Also ist $\alpha A \in M$ und M auch abgeschlossen bzgl. Skalarmultiplikation.

Da alle drei Teilraumkriterien erfüllt werden, ist M ein Teilraum des $\mathbb{R}^{2,2}$.

(b) **(3 Punkte)**

Wähle $A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$\mathcal{B} \subseteq M$, da $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in M$ wegen $0 - 0 = 0$ und $A \in M$ wegen $1 - 1 = 0$.

Aus $\alpha_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ folgt durch Komponentenvergleich das LGS $\alpha_1 = 0, \alpha_3 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0$. Die drei Matrizen lassen sich nur trivial zur Nullmatrix linear kombinieren und sind somit linear unabhängig.

Da die drei Matrizen in \mathcal{B} linear unabhängig sind und $\mathcal{B} \subseteq M$, ist \mathcal{B} eine Basis des (nach Aufgabenstellung) dreidimensionalen Teilraums M .

(c) **(2 Punkte)**

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in N$, da $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Aber $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \notin M$, da $1 - 0 = 1 \neq 0$.
 $N \not\subseteq M$ und somit kein Teilraum von M .

alternativ: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in N$, da $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ und

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in N$, da $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Aber $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \notin N$, da $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.
 N ist nicht abgeschlossen bzgl. Addition und somit kein Teilraum.

6. Aufgabe

9 Punkte

Gegeben sei der euklidische Vektorraum \mathbb{R}^2 ausgestattet mit dem Standardskalarprodukt und die Matrixabbildung $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. P beschreibt die Spiegelung an der Geraden $\text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$.

- (a) Ist $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ein Eigenvektor von P ? Falls ja, zu welchem Eigenwert gehört er?
- (b) Gibt es einen zu $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ linear unabhängigen Eigenvektor von P ? Falls ja, zu welchem Eigenwert gehört er?
- (c) P ist diagonalisierbar.
Bestimmen Sie eine invertierbare Matrix $S \in \mathbb{R}^{2,2}$, sodass $P = S \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} S^{-1}$ gilt.
- (d) Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem: $\frac{d\vec{y}}{dt}(t) = P\vec{y}(t)$ für $\vec{y}_0 = \vec{y}(5) = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(a) **(2 Punkte)**

Bei der Spiegelung im \mathbb{R}^2 an der Geraden $\text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$ werden alle Vektoren $\vec{v} \in \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$ auf sich selbst abgebildet. Da der Vektor $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ im Spann von sich selbst liegt, gilt

$$P \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ist Eigenvektor zum Eigenwert 1 von P .

(b) **(3 Punkte)**

Alle zu der Geraden $\text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$ orthogonalen Vektoren werden durch P auf -1 mal sich selbst abgebildet.

$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ist orthogonal zu $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, da $\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \rangle_{\text{std}} = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$.

Da beide Vektoren nicht der Nullvektor und orthogonal bzgl. des Standardskalarprodukts sind,

sind sie linear unabhängig und es gilt $P \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ist Eigenvektor zum Eigenwert -1 von P .

- (c) **(2 Punkte)** In der Diagonalmatrix stehen die beiden Eigenwerte von P . In S stehen entsprechend den Diagonaleinträgen der Diagonalmatrix linear unabhängige Eigenvektoren. Mit den Resultaten aus a) und b) ist $S := \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

- (d) **(2 Punkte)** $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ ist eine Linearkombination von Eigenvektoren von P , denn es gilt:
 $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. mit $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ Eigenvektoren zum Eigenwert 1 bzw. -1 von P .
Somit ist
 $\vec{y}(t) = e^{1(t-5)} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + e^{-1(t-5)} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{t-5} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + e^{-t+5} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{t-5} + 2e^{-t+5} \\ -2e^{t-5} + e^{-t+5} \end{bmatrix}$