

1. Aufgabe

(9 Punkte)

Gegeben seien

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \\ 2 & 10 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3} \quad \text{und} \quad \vec{b} := \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

- (a) Bestimmen Sie A^{-1} .
- (b) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des reellen linearen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{b}$.
- (c) Bestimmen Sie $\text{Kern}(A)$ und $\dim(\text{Bild}(A))$.
- (d) Liegt der Vektor $\vec{b}_1 := \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ im Kern von A ?

Lösung:

- (a) [4 Punkte]

Wir betrachten die erweiterte Koeffizientenmatrix $[A|I_3]$ und formen um

$$\begin{aligned} [A|I_3] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 10 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 10 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\text{III}-2\cdot\text{I}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\text{I}-5\cdot\text{II}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Die Inverse von A ist durch $A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ gegeben.

- (b) [2 Punkte]

Die einzige Lösung \vec{x} des Systems $A\vec{x} = \vec{b}$ ist gegeben durch

$$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten als Lösungsmenge $\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$.

- (c) [2 Punkte]

Da A bijektiv und damit insbesondere injektiv ist, gilt $\text{Kern}(A) = \{\vec{0}\}$. Da A insbesondere auch surjektiv ist, gilt $\dim(\text{Bild}(A)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

- (d) [1 Punkt]

Nein, da A invertierbar ist und somit $\text{Kern}(A) = \{\vec{0}\}$ gilt.

2. Aufgabe

(8 Punkte)

Gegeben sei die Matrix $B := \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$.

- (a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte und die zugehörigen Eigenräume von B .
- (b) Ist B diagonalisierbar?
- (c) Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$\frac{d\vec{y}(t)}{dt} = B\vec{y}(t), \quad \vec{y}_0 = \vec{y}(-3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Lösung:

- (a) [4 Punkte]

Da B eine obere Dreiecksmatrix ist, stehen die Eigenwerte auf der Hauptdiagonalen:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 0 \quad \text{und} \quad \lambda_3 = 4.$$

Für die Eigenräume von λ_1 , λ_2 und λ_3 gilt:

$$V_{\lambda_1=3} = \text{Kern}(B - 3 \cdot I) = \text{Kern} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\begin{aligned} V_{\lambda_2=0} &= \text{Kern}(B - 0 \cdot I) = \text{Kern} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \text{Kern} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{\lambda_3=4} &= \text{Kern}(B - 4 \cdot I) = \text{Kern} \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Kern} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

- (b) [2 Punkte]

Da die geometrische und die algebraische Vielfachheit für jeden Eigenwert jeweils eins ist, ist B diagonalisierbar.

- (c) [2 Punkte]

Der gegebene Vektor kann als Linearkombination von Eigenvektoren geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt

$$y(t) = e^{B(t+3)} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot e^{3(t+3)} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot e^{0 \cdot (t+3)} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Aufgabe

(6 Punkte)

Für einen Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ sei

$$C_\alpha := \begin{pmatrix} -2 & \alpha & 0 & 3 \\ 4\alpha & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,4}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Determinante von C_α mit dem Laplaceschen Entwicklungssatz (angewandt auf 4×4 - und 3×3 -Matrizen).
- (b) Für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ hat C_α den Eigenwert 0?
- (c) Berechnen Sie die Determinante von $(C_{-1})^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) C_9^T$.

Lösung:

- (a) [3 Punkte]

Wir berechnen die Determinante von C_α mit dem Laplaceschen Entwicklungssatz:

$$\begin{aligned} \det(C_\alpha) &\stackrel{3. \text{ Spalte}}{=} (-1) \cdot (-3) \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & \alpha & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{2. \text{ Zeile}}{=} 3 \cdot \left(1 \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & \alpha \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \right) \\ &= 3 \cdot ((2 - 6) - (4 - 2\alpha)) = 6\alpha - 24. \end{aligned}$$

- (b) [1 Punkt]

Die Matrix C_α hat den Eigenwert 0 genau dann, wenn $\det(C_\alpha) = 0$ und dies gilt genau dann, wenn $\alpha = 4$.

- (c) [2 Punkte]

Es gilt

$$\det \left((C_{-1})^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) C_9^T \right) = (\det(C_{-1})^{-1}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \det(C_9) = -\frac{1}{30} \cdot \frac{1}{16} \cdot 30 = -\frac{1}{16}.$$

4. Aufgabe

(7 Punkte)

Welche der folgenden Mengen sind Teilräume? Beweisen oder widerlegen Sie Ihre Aussagen.

(a) $S_1 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \leq x_2 \right\} \subseteq \mathbb{R}^2$

(b) $S_2 := \{B \in \mathbb{R}^{3,3} \mid B \text{ besitzt genau drei paarweise verschiedene Eigenwerte}\} \subseteq \mathbb{R}^{3,3}$

(c) $S_3 := \{ax + b \in \mathbb{R}_{\leq 1}[x] \mid a + b = 0\} \subseteq \mathbb{R}_{\leq 1}[x]$

Lösung:

(a) [2 Punkte]

S_1 ist kein Teilraum, denn es gilt $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in S_1$ aber $(-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \notin S_1$. Damit ist S_1 nicht abgeschlossen bzgl. der Skalarmultiplikation, also auch kein Teilraum des \mathbb{R}^2 .

(b) [2 Punkte]

Die Nullmatrix ist nicht in S_2 , also ist S_2 kein Teilraum.

(c) [3 Punkte]

S_3 ist ein Teilraum des $\mathbb{R}_{\leq 1}[x]$, denn:

(i) S_3 ist nicht leer, da offenbar $\vec{0} \in S_3$.

(ii) Für $\vec{p} = ax + b \in S_3$ und $\vec{q} = cx + d \in S_3$ gilt $\vec{p} + \vec{q} = (a + c)x + (b + d)$ wobei

$$(a + c) + (b + d) = (a + b) + (c + d) = 0$$

gilt. Somit gilt $\vec{p} + \vec{q} \in S_3$. Damit ist S_3 abgeschlossen bzgl. der Addition.

(iii) Es sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\vec{p} = ax + b \in S_3$. Dann folgt

$$\lambda \cdot \vec{p} = \lambda \cdot (ax + b) = (\lambda a)x + \lambda b$$

wobei $\lambda a + \lambda b = \lambda(a + b) = 0$ gilt. Somit ist $\lambda \cdot \vec{p} \in S_3$. Damit ist S_3 abgeschlossen bzgl. der Skalarmultiplikation.